

100% ΟΡΓΑΝΙΚΟ – ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Maxicrop®



ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ

Κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές,
εμβάπτιση σπόρων και ριζοποτίσματα σε όλες τις καλλιέργειες

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών
(σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004, ΦΕΚ 35/Β/16-1-2004)

8% ΣΕ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ *ASCOPHYLLUM NODOSUM*

Καθαρό Βάρος: **20 λίτρα**

BIO

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙ.Π.Ε.Θ. - Σύνδος
Τηλ: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



Maxicrop® ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Maxicrop® ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ: Το Maxicrop® περιέχει 80 γρ. εκχυλίσματος φυκών του είδους *Ascophyllum Nodosum* ανά λίτρο σκευάσματος, εκ των οποίων το 63,4% είναι οργανική ουσία. Πιο συγκεκριμένα περιέχει:

ΦΥΤΟΡΜΟΝΕΣ: Αυξίνες, Γβερελλίνες, Κυτοκινίνες.

ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μπεταΐνες (ισοροπτημένο μείγμα γ-αμινοβουτυρικού οξέος, δ-αμινοβαλερικού οξέος και γλυσινομπεταΐνης).

ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ: Αλγινικό οξύ, Μανιτόλη, Λαμιναρίνη, Πεντοζάνες, Αμινοξέα, Βιταμίνες κ.ά.

ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ: Περιέχει περίπου 60 μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται σε χηλική μορφή (N, P, K, Fe, Zn, B, I, Br, Cu, Ni, Mo, Co, Si, Al κ.ά.).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Maxicrop® είναι φυσικός βιοδιεγέρτης, με βάση εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών του είδους *Ascophyllum Nodosum*.

Είναι σε υγρή μορφή και εφαρμόζεται με εμβάπτιση σπόρων ή εμποτισμό εδαφικού υποστρώματος σπορειών, με διαφυλλικούς ψεκασμούς και ριζοτόπσιμα.

Με το Maxicrop® επιτυγχάνουμε:

- Αύξηση και επιτάχυνση της φυτρωτικότητας και της ριζοβολίας
- Ισχυροποίηση του ριζικού συστήματος και του βλαστού
- Επιτάχυνση της ανάπτυξης και πρωίμηση της παραγωγής
- Αύξηση της καρπόδεσης
- Βελτίωση της ποιότητας των καρπών
- Μεγαλύτερη αντοχή στα διάφορα «στρες» και σε αρκετές ασθένειες - εχθρούς
- Βελτίωση των βιολογικών και φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους
- Συνεργιστική αύξηση της αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων.

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΧΡΗΣΕΙΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΟΣΠΡΙΑ: α) Για εμβάπτιση σπόρων ή εμποτισμό εδαφικού υποστρώματος σπορειών με δόση 1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) Για διαφυλλικούς ψεκασμούς με δόση 0,5-1 λίτρα/ 100 κιλά νερό. γ) Για ριζοτόπσιμα, με δόση 1 κ.εκ. ανά φυτό ή 5-10 λίτρα/ στρέμμα με 3-4 εφαρμογές κάθε 15 ημέρες μετά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων. Για τις καλλιέργειες που μεταφυτεύονται, οι εφαρμογές ξεκινούν 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, ενώ γίνεται και μια πριν απ' αυτή με μικρότερη δόσολογία.

ΠΑΤΑΤΑ: α) Πριν την σπορά: Εμβάπτιση κονδύλων για 24 ώρες σε διάλυμα με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) Μετά τη σπορά: 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες, που ξεκινούν όταν το φύλλωμα φτάσει τα 7-10 εκ., με δόση 1-1,5 λίτρα/ 100 κιλά νερό.

ΑΜΠΕΛΙ: α) Εμποτισμός εδαφικών υποστρωμάτων για ριζοβόληση μοσχευμάτων με δόση 1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) 3-4 ψεκασμοί με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. Ο πρώτος ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων και οι υπόλοιποι πριν και μετά την άνθηση.

ΒΑΜΒΑΚΙ: 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό, μετά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων.

ΚΑΠΝΟΣ: Όμοια με τα λαχανικά που μεταφυτεύονται.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ (ΜΗΛΟΕΙΔΗ-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ): 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την άνθηση, με δόση 0,5-1 λίτρο/100 κιλά νερό και ένας μετά τη συγκομιδή με δόση 1-1,5 λίτρα/100 κιλά νερό.

ΑΕΙΘΑΛΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ-ΕΛΙΑ): Πρώτος ψεκασμός πριν την άνθηση και 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την άνθηση, με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό.

ΣΙΤΗΡΑ: 1-2 ψεκασμοί μετά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων και ένας νωρίς την άνοιξη με δόση 1-1,5 λίτρα/100 κιλά νερό.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ - ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΑΡΑΒΟΞΙΤΟΣ - ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΥΦΑΛΙ, κ.ά.): 2-3 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την έναρξη της βλάστησης με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό.

ΓΚΑΖΟΝ: α) Για ψεκασμούς με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό β) Για ριζοτόπσιμα, με δόση 1-1,5 λίτρα/ στρέμμα. Πραγματοποιείται ένας ψεκασμός μετά την έναρξη της βλάστησης και τακτικοί ψεκασμοί κάθε 15-20 ημέρες καθόλη την περίοδο ανάπτυξης. Εφαρμόζεται και με το σύστημα άρδευσης.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Για ψεκασμούς με δόση 200-500 κ.εκ./ 100 κιλά νερό β) Για ριζοτόπσιμα, με δόση 1 κ.εκ./ φυτό ή 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. Από την άνοιξη και καθόλη την περίοδο ανάπτυξης, κάθε 10-15 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό για καμία καλλιέργεια.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα τα γνωστά σκευάσματα εκτός από τα ορμονικά ζιζανιοκτόνα, δεινικά και αλκαλικά σκευάσματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30 °C.

Να φυλάσσεται σε ασφαλέως χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Καθαρό Βάρος: **20 λίτρα**